



**CUPROBORD** *gel*

## RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg./ ha	EPOCA DE APLICACION
VID	PERONOSPORA (Plasmopara vitícola)	3 a 7	Realizar la primera aplicación cuando los brotes tengan de 10 a 20 cm de largo. La segunda aplicación en enero. De ser necesario, una tercera en marzo. <b>IMPORTANTE:</b> Tener siempre presente las condiciones climáticas de calor y humedad para reforzar los tratamientos. <b>ESTAR ATENTO AL SISTEMA DE ALARMAS DE LA ZONA</b>
OLIVO	Tuberculosis del olivo (Pseudomonas savastanoi) Cercospora del Olivo (Cercospora cladosporioide s) Mancha en ojo o Viruela (Cycloconium oleaginum) Fumaginas	3 a 7	Realizar la cura lo antes posible luego de realizada la cosecha de la aceituna y antes de efectuar la poda. Pulverizar luego de cada granizada. En caso de TUBERCULOSIS, extirpar el o los tumores y desinfectar el corte Usarlo también para desinfectar las herramientas.
TOMATE PIMIENTO	Tizón Temprano (Alternaria solana) Viruela del tomate (Sptoria lycopersici) Viruela del Pimiento (Septoria sp)	3 a 7	Realizar la primera aplicación en el almácigo, la segunda al trasplantar, la tercera unos días antes de la floración y la cuarta cuando los frutos estén todavía verdes.
FRUTALES DE CAROZO	Viruela Holandesa (Coryneum carpophilum) Torque del Duraznero (Taphrina deformans)	3 a 7	Se recomienda la primera aplicación en otoño, después de la cosecha y antes de la caída de las hojas. La segunda aplicación al final del invierno y antes que empiecen a hincharse las yemas.
NOGAL	Bacteriosis del Nogal (Xanthomonas vesicatoria)	3 a 7	Realizar las aplicaciones en función de las condiciones climáticas. Comenzar las aplicaciones cuando aparece la flor masculina y repetir en función de las condiciones ambientales cada 20 d
PAPA	Tizones Temprano y Tardío (Alternaria y Phytophthora)	3 a 7	La primera aplicación cuando las plantas tienen de 10 a 12 cm de altura. Repetir según lo indiquen las condiciones predisponentes. <b>RESPECTAR LA ALARMA LOCAL</b>